

<b>Temmincktragopan (<i>Tragopan temminckii</i>)</b>		Version 1 – 12.09.2021
<b>Autoren</b>	Gerd Laub	
<b>Internationale Namen</b> <a href="https://avibase.bsc-eoc.org/">https://avibase.bsc-eoc.org/</a>	<a href="#">Link: Hier klicken für Weiterleitung auf externe Webseite von Avibase</a>	
<b>Herkunft / Lebensraum</b>	Temmincktragopane sind Hochgebirgsvögel und die am weitesten verbreiteten Tragopane. Sie kommen in Höhen von 1.000 bis 4.000 m vor. Ihr Verbreitungsgebiet reicht von Nordost-Indien über Nord-Myanmar und Tibet bis Nordost-China. Die Art bevorzugt steile, regenreiche Gebirgswälder mit reichlich Unterholz und Bambusdickicht.	
<b>Unterarten</b>	Keine	
<b>Status in der Natur</b>	Trotz des großen Verbreitungsgebiets ist die Gesamtpopulation aufgrund von Lebensraumverlust durch Abholzung und Landgewinnung rückläufig. Weitere Bedrohungsfaktoren sind die Jagd und das Absammeln von Eiern.	
<b>Globaler Bedrohungsstatus</b> <a href="https://www.iucnredlist.org/">https://www.iucnredlist.org/</a>	IUCN Rote Liste 2021 = nicht gefährdet (LC). <a href="#">Link: Hier klicken für Weiterleitung auf externe Webseite von IUCN Rote Liste</a>	
<b>Internationaler Schutzstatus</b> <a href="https://www.speciesplus.net/">https://www.speciesplus.net/</a>	<a href="#">Link: Hier klicken für Weiterleitung auf externe Webseite von CITES Species+</a>	
<b>Aktueller Status in unseren Volieren (Ex-situ)</b>		<b>1 Koordiniertes Erhaltungszuchtprogramm</b>
	X	<b>2 Bestand etabliert und stabil</b>
		<b>3 Bestand instabil</b>
		<b>4 Sporadisch gehalten</b>
		<b>5 Nicht gehalten</b>
<b>Haltung in Zoos</b> <a href="https://www.zootierliste.de/">https://www.zootierliste.de/</a>	<a href="#">Link: Hier klicken für Weiterleitung auf externe Webseite von Zootierliste</a>	
<b>WPA Fokusgruppe</b>	<a href="#">Tragopan - Fokusgruppe</a>	
<b>Gesamtlänge</b>	♂ = ca. 68 cm, ♀ = etwas kleiner	
<b>Gewicht<sup>1</sup></b>	♂ = 1.362 – 1.442 g, ♀ = 907 – 1.021 g	
<b>Stimme / Ruf</b> <a href="https://www.xeno-canto.org/">https://www.xeno-canto.org/</a>	<a href="#">Link: Hier klicken für Weiterleitung auf externe Webseite von Xeno-Canto</a>	
<b>Geschlechtsreife</b>	im 2. Lebensjahr	
<b>Höchstalter<sup>2</sup></b>	21 Jahre	
<b>Brutperiode</b>	meist ab Anfang April	
<b>Gelegegröße</b>	2 – 4 Eier	
<b>Brutdauer</b>	28 Tage	
<b>Ringgröße</b>	14 mm	
<p>Temmincktragopane sind die am häufigsten gehaltenen Tragopane. Sie stellen keine besonderen Ansprüche bei der Haltung und sind als Hochgebirgsvögel winterhart. Tragopane halten sich viel in Baumkronen auf und klettern in den Ästen, wo sie nach Knospen und Beeren suchen. Als Baumbrüter benötigen sie zur Zucht in etwa 1 m Höhe aufgehängte Körbe. Die Balz ist ein spektakuläres Schauspiel, während der der Hahn seinen bunten Kehllatz und die zwei türkisfarbenen, hornartigen Hautzapfen am Kopf präsentiert. Hierzu benötigt der Hahn ein Hindernis wie einen größeren Stein oder Baumstamm, um sich dahinter aufzubauen um sich dann in aufrechter Haltung der Henne zu nähern. Temmincktragopane benötigen bei der Fütterung einen hohen Grünfutteranteil sowie Obst. Fetthaltige Sämereien sind zu vermeiden.</p>		

**Quellen**

1. Gewichte: *CRC Handbook of Avian Body Masses*. Dunning, J. B., Jr. 2008
2. Höchstalter/Generationsdauer: *Generation lengths of the world's birds and their implications for extinction risk*. Bird, J. P. et al. 2020 <https://doi.org/10.1111/cobi.13486>
3. Allgemein: *Monograph of the Pheasants*. Hennache, A. Ottaviani, M 2020

